



# LEITFADEN KRANKHEITEN

## **Liebe Erziehungsberechtigten,**

wir wissen, wenn Kinder krank sind, ist es oft schwierig für die Familie, die Kinderbetreuung zu organisieren.

Mit diesem Leitfaden möchten wir Euch unterstützen und eine Hilfestellung geben. Euch aber auch sensibilisieren und aufzeigen, was es für uns alle bedeutet und welche Konsequenzen es möglicherweise haben kann, wenn trotz Krankheit die Kinder in den Kindergarten gebracht werden.

Besuchen kranke Kinder die Gemeinschaftseinrichtung, besteht **akute Gefahr**, dass **viele Personen**, mit denen das Kind dort unweigerlich Kontakt hat, **angesteckt werden - Kinder** und das **Personal**.

Dann müssen viele Eltern die Betreuung ihrer kranken Kinder organisieren.

Bei fehlendem Personal müssen manche Aktivitäten ausfallen, schlimmstenfalls muss eine Notgruppe eingerichtet werden, in der nicht alle Kinder betreut werden können.

Besonders gefährlich wird es, wenn z.B. Kinder / Personal mit Vorerkrankungen oder schwangere Mütter angesteckt werden.

### **Entscheidungshilfe - Kann mein Kind die Kita besuchen?**

- Bekommt mein Kind Medikamente, z. B. Antibiotikum, fiebersenkende Mittel, (der Körper ist dadurch geschwächt)?
- Ein Kita Tag beinhaltet die Anstrengung eines Arbeitstages für Erwachsene. Ist mein Kind fit genug dafür?
- Besteht Ansteckungsgefahr? Abklären beim Arzt

Falls Ihr eine der Fragen mit **JA** beantwortet, muss das Kind zuhause bleiben. Zum Schutz für das Kind selbst und alle anderen.

## Übersicht - wie lange ist welche Krankheit ansteckend?

Hier findet Ihr eine kleine Übersicht über die häufigsten Krankheiten und wann das Kind danach wieder in die Einrichtung gehen darf. Wenn Ihr trotzdem unsicher seid, ob das Kind noch ansteckend ist, fragt bitte Euren Kinderarzt.

Bindehautentzündung	2-3 Tage nach der 1. Behandlung mit antibiotischen Augentropfen
Dreitagefieber	Nach Abklingen des Hautausschlages
Fieber	48 Stunden nach Abklingen des Fiebers (ohne Medikamente) / symptomfrei
Hand-Mund-Fuß-Krankheit	Ca. nach 7- 10 Tagen, wenn der Ausschlag nicht mehr nässt
Herpes	Nach etwa zehn Tagen ist der Lippen-Herpes in der Regel abgeheilt
Influenza (Virusgrippe)	7 Tage nach Ausbruch, wenn es dem Kind gut geht ( <b>ohne Medikamente</b> )
Keuchhusten (Pertussis)	Frühestens 5 Tage nach Behandlungsbeginn
Kopfläuse	Nach fachgerechter Anwendung eines zur Tilgung des Kopflausbefalls geeigneten Mittels, ergänzt durch sorgfältiges Auskämmen des Haares mit einem Läusekamm
Krätze (Skabies)	Nach Freigabe durch den Arzt
Magen-Darm-Infekt (Norovirus) / Erbrechen und /oder Durchfall	48 Stunden nach Abklingen der Symptome ( <b>ohne Medikamente</b> )
Masern	Frühestens 5 Tage nach Auftreten des Hautausschlages
Mumps	Nach Abklingen der Symptome oder 9 Tage nach Auftreten der Speicheldrüsenschwellung
Respiratorische Synzytial-Virus-Infektionen (RSV)	48 Stunden nach dem Abklingen der Symptome
Ringelröteln	Sobald der Hautausschlag auftritt
Röteln	Nach Abklingen der klinischen Symptome, jedoch frühestens am 8. Tag nachdem der Hautausschlag begonnen hat, möglich
Scharlach	24 Stunden nach Beginn einer wirksamen Antibiotikatherapie und dem Abklingen der Symptome
Windpocken	Eine Woche nach Beginn einer unkomplizierten Erkrankung

**Die  
AHA-Regeln  
Abstand, Hygiene und Armbeuge Niesen und Husten  
gelten bei Krankheit immer!**



**Vielen Dank für Eure Mithilfe!**

**Das Johannisbärenteam**